

	<u>HAAS</u>	<u>KONIJN</u>
Gewicht	2,5 tot 3,5 KG langgerekt gespierd lichaam	+/-2kg kleiner en gedrongen tov de haas
Haarkleed	-Donkere rug -bovenhaar geel- tot okerbruin met zwarte haarpunt -witte onderwol -Witte buik en onderstaart. Pluim->zwarte dekharen - Zwarte oorpunten -Getijgerde kop	-Fijne haarstructuur -Eentonig bruin-grijs -grijs-witte buik -GEEN zwarte oorpunten - Oranje-bruine vlek in de nek onder de oren
Ouderdom	-Gewicht ooglens geeft exacte ouderdom -Jonge haas tot 8 a 10 maand->beentje van STROH=verdikking aan polsgewricht buitenkant voorlopers -afstand tss geslachtsorgaan en anus in groter bij jonge dieren. Geslachtsorganen zijn bij jonge dieren veel minder ontwikkeld. -haas van 1 maand weegt ongeveer 1kg haas van 2 maand weegt ongeveer 2 kg	-Gewicht ooglens geeft exacte ouderdom
Geslachtverschil	-uiterlijk is het verschil enkel te zien door het naar buitendrukken van de anale streek, zodat geslachtsorganen zichtbaar worden Ter info : -wanneer haas zich drukt, in de dekking: ->rammelaar oren gestrekt naar achter ->moer oren afhangend naar de grond	-uiterlijk is het verschil enkel te zien door het naar buitendrukken van de anale streek, zodat geslachtsorganen zichtbaar worden
Gebit	In de bovenkaak staan bij beiden 2-paar achter elkaar staande snijtanden voorst: breed en groot met een lengte-groef Achterste: kleiner en smaller -> de zogenaamde Stifftanden	
Oren	-oren even lang of langer dan de kop - ZWARTE punteinden -grote oren dienen voor thermoregulatie Hazen zweten niet en tong te klein en warmte af te voeren zoals honden -bewegen onafhankelijk van elkaar en dienen om geluid op te vangen hazen horen tot 600m ver! -nuttig voor oriëntatie 's nachts	Oren kleiner dan de kop -oren zijn zeer beweeglijk en lepelvormig - GEEN zwarte punteneinden Konijn hoort zeer goed
Ogen	- amberkleurig irisveld -grote pupillen die niet samentrekken ->afgesteld op donker/haas is verblind door fel lichtbundels 's nachts->stropers -ogen staand zijdelinks op kop → geeft groot gezichtsveld =>360°	- donkerbruin irisveld -ogen staand zijdelinks op kop → geeft groot gezichtsveld =>360°
Reukzin	Zeer goed ontwikkeld Om verwaaing op te vangen gaan flap-vormige neusvleugels bewegen->neusgaten open en toe	-Goed ontwikkelde geurzin -Neus heeft een rond profiel
tastzin	SNORHAREN!! => de hazenbaard -haas voelt alles aankomen door in het leger zijn snorharen tegen de grond te houden en zo trillingen op te vangen -snorharen dienen tevens als maatstok voor wissels.	
Levenswijze	- Haas leeft solitair Hazen komen samen tijdens de paarperiode Moer blijft 28tot30 dagen bij jongen -Rammelaar en moer zijn polygaam -leeft binnen woongebied van 20ha meerdere hazen op een terrein mogelijk! Heeft geurklieren in kaak en onder staart. Brengt geur via kaakklieren over op behaarde voetsoelen → geeft geurspoor voor honden en predatoren	- sociaal levende dieren onder hiërarchische structuur => baas blaast urine op ondergeschikten Individen leven in families / verschillende families vormen een kolonie Verschillende kolonies vormen een populatie Konijn is monogaam Koppels blijven levenslang trouw. Echter levensverwachting is meestal minder dan 1j Groepsleden worden getolereerd. Vreemden worden verjaagd tot aan de rand van het territorium afgebakend door vloeistoffen uit geurklieren uit te smeren op planten.

Woonst	Rust overdag in een POT of LEGER onder de blote hemel Haas heeft binnen zijn leefgebied van 20ha en heeft hier verschillende legers. Dit laat hem toe om steeds een leger te vinden om te rusten met zijn hoofd tegen de wind in. Zo blijven rugharen platgedrukt en is er geen warmteverlies. Haas wisselt elke dag van leger en komt na enkele dagen terug naar vorig leger.	Konijn leeft in een holenstelsel onder de grond -> BURCHT Konijn gaat nooit verder dan 200m van zijn burcht
Rammeltijd	December tot september Moer heeft eisprong 12u na de dekking Liefde maakt hazen blind! Wanneer de haas de lokkende feromonen van de moer opneemt, gaat hij daar recht op af. Ook overdag wanneer hij slecht ziet. Menig haas komt zo onder een wagen terecht.	Februari tot september Moeren zijn om de 7 dagen seksueel aantrekkelijk. Er is een geïnduceerde ovulatie
Dracht	40 tot 45 dagen	28 tot 30 dagen Bij konijnen kan men een natuurlijke manieren van vermijden van overbevolking in een gebied waarnemen. Enerzijds het absorberen van bevruchte eicellen en embryonale sterfte. Anderzijds kannibalisme. zo wordt over-populatie vermeden
Werpen	-Hazenmoer werpt rechtop zittend, onder de blote hemel -Werpt mogelijks reeds eind januari 4 -5 worpen per jaar 2 tot 4 jongen per worp =>per jaar +/- 12 jongen	-Konijnenmoer werpt in een werppijp. Dominante moer in de burcht van de familie. Andere moeren graven zelf een werppijp -Werpt februari tot september -4 tot 7 worpen per jaar -van +/- 5 jongen per worp =>per jaar +/- 30 jongen
Jongen	Geboren onder de blote hemel Zijn behaard, kunnen zien en kunnen eigen lichaamstemperatuur regelen. Hazenjongen kunnen bij gevaar hun poriën afsluiten om geen geur af te geven. =>verstarren	Geboren in werppijp in wentelkamer. Zijn naakt en blind bij geboorte
Zogen	Moer vertoeft overdag op enkele 100den meter van de verzamelplaats(pot) van haar lampreien. 45min na zonsondergang gaat moer haar jongen enkele minuten zogen. Na 17 dagen overstap naar groenvoer Zoogt jongen gedurende 30 dagen	Lampreien worden door konijnenmoer 1 tot 2 maal per etmaal gezoogd. Tussen de 16 en 21 dag verlaten lampreien de eerste maal hun pijp. Tijdens 3^{de} week beginnen jongen rond te lopen en vast voedsel te nemen Rond de 4^{de} week verlaat de konijnenmoer haar jongen om een nieuw nest te beginnen.
Laveien	Haas eet tussen zonsondergang en zonsopvang. Eet vers jong groen voedsel → SELECTIEF Haas drinkt water	Konijn eet bij halfduister. Bij valavond en vroeg in de ochtend Drinkt zelden. Haalt vocht uit voedsel
Pekelen	Zowel haas als konijn moet men na het afschot PEKELEN. Hierbij wordt de urine uit het dode dier verwijderd door op de buik te duwen. Dit om het wildbraad niet te bederven. Gebeurt best binnen de 30 minuten. → na 10-15 min wordt urineblaas poreus!!!	
Caecofagie	Zowel haas als konijn doen aan CAECOFAGIE een fenomeen waarbij voedsel niet in 1 keer kan worden afgebroken en worden opgenomen. Een spinazie-achtige substantie wordt samen met de keutels uitgescheiden door de anus. De spinazie-achtige substantie wordt opnieuw met de mond opgenomen.	
Ziektes	Coccidiose → parasiet Brown hair → Virus	Myxomatose → virus VHS → virus