

Rechtbekken

Zwarte kraai	Bonte kraai	Roek	Raaf	Kauw	Ekster	Vlaamse gaai
						
-Leeft paarsgewijs of in gezinsverband -Jonge dieren leven in groep! -Kan slijmerige niet-compacte braakballen achter laten	Slechts aan te treffen vanaf oktober=>wintergast, doortrekker GEEN STATUUT	Groter dan kauw kleiner dan kraai	Grootste kraaiachtige GEEN STATUUT	Standvogel die dicht bij de mens leeft in grote groepen. Zorgen voor overlast Kleinste kraaiachtige	Standvogel Zeer sluw	Standvogel, wintergast en doortrekker Boomplanter door eikels in te graven
-47cm groot 1m spanwijdte -volledig matzwart -afgeronde staart -krachtige puntige zwarte snavel -zwarte poten -geen geslachtsdismorfisme -jonge kraai met witte pennen ➔niet aangepaste voeding, te weinig dierlijk voedsel	Net zo groot als zwarte kraai Grijze achternek, mantel en buik -De rest zwart als kraai	Grijs-witte kale vlek aan snavelwortel Loopbenen bedekt met "afgezakte broek"	64cm groot spanwijdte tot 1,2m -Matzwarte vogel met wigvormige staart in de vlucht -Veel zwaardere snavel dan andere kraaiachtigen Zwarte poten	-33cm groot, spanwijdte 65cm -grijze nek en kop -zwart lichaam -stevige donkere snavel -zwarte poten -helder oog	+/- 46cm groot, spanwijdte 60cm -kop, hals, keel en borst zijn zwart met witte buik -lange blauwglanzende trapvormige staart -stevige donkere snavel -donkere poten	Even groot als turkse tortel en kauw -Boven- en onderzijde zijn bruin -Zacht blauw en zwart gestreepte schouderveren -witte vleugelvlek -zwart-wit gestreepte kruinveren -zwarte baardstrepen
Voortplanting: -Bouwt nest in maart Nooit in top, maar vork zijtak -vrouwkje broed alleen -4-5 eieren -3 weken bebroed -1 legsel per jaar - paren vanaf einde 2 ^{de} levensjaar	Voortplanting: -Broed vanaf eind maart tot juni -1 legsel per jaar -3 tot 7 eieren	Voortplanting: -nestelt einde maart en broed in kolonies -hoger gelegen nesten in bomen -soms kolonies tot 100 koppels -eieren 4 tot 5 - paren vanaf einde 2 ^{de} levensjaar	Voortplanting: -nestelt eenzaam in hoge bomen -begin maart worden 4-6 eieren uitgebroed door vrouwkje. Mannetje zorgt voor eten	Voortplanting: Nestelt in holen. Nesten in boomholtes, gebouwen(schoorstenen, onder dakpannen) -april – juni 4 tot 6 eieren	Voortplanting: -nestelt vanaf maart -4-5 eieren in april-mei -komen uit na 17-18 dagen -nest is zwaar takkenbouwsel, soms met dak ➔in top van boom!!	Voortplanting: -Ondiepe nest vind je overal, maar nooit hoog in kruin -nestelt vanaf april -3 tot 7 eieren -uitgebroed door vrouwkje en mannetje in april-mei
Voedsel: Alleseter Alle soorten kleine dieren, vruchten en alle soorten aas eieren kuikens jongen	Voedsel: Idem als kraai	Voedsel: 90% insecten en larven vanop de grond Soms kleine vogels van bodembroeders	Voedsel: Alleseter Kleine zoogdieren, vogels, eieren, ongewervelden, zaden, vruchten	Voedsel: -insecten, kevers, kikkers, vruchten; -neemt eieren en kleine vogels uit nesten	Voedsel: Vooral actief rover van nesten liefst fazant en eendennesten -ook insecten, larven, aas, bessen, ...	Voedsel: Eet alles: zaden insecten, larven, eikels,... Tijdens lente rooft hij nesten zangvogels
Schade: Zonder dekking is niets veilig Gekiemde zaden worden uitgetrokken	Schade: / /	Schade: Geen schadelijke vogel	Schade: / /	Schade: / /	Schade: Tot 50% van nesten fazanten en eenden wordt door eksters vernietigd	Schade: / /
Biotoop: Open veld en bosgebied	Biotoop: Idem als kraai	Biotoop: Leeft in buurt van landbouw-gebied met hoge bomen als slaappleaats	Biotoop: Leeft in bossen, vlakten en tuinen	Biotoop: Stedelijke omgeving, maar ook op akkers, bossen en weilanden	Biotoop: Open veld, akkers, struikgewas, parken, tuinen en stedelijk gebied	Biotoop: Bossen en parken Ook in de buurt van woningen
Bedreiging: Enkel havik als natuurlijke vijand	Bedreiging: Idem als kraai	Bedreigingen: / /	Bedreigingen: / /	Bedreigingen: / /	Bedreigingen: / /	Bedreigingen: / /